

MRI BORSTEN



ONDERZOEK

Na het aanmelden komt de technoloog u ophalen voor het onderzoek. U kleedt u uit en daarna prikt de technoloog een infuus in de arm. Via dit infuus krijgt u contrastmiddel ingespoten. Dit is vrijwel pijnloos. Tijdens het onderzoek ligt u plat op uw buik, met een uitsparing voor uw borsten. De onderzoekstafel waar u op ligt wordt schuift het MRI-apparaat in. Via een spiegeltje kunt u steeds naar buiten kijken. Tot hoever is afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. U krijgt een alarmbelletje in uw hand. Als er iets is kunt u hierin knijpen om de technoloog op te roepen indien er toch iets zou zijn.

VOORBEREIDING

U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

U krijgt een schort aangeboden. De BH moet sowieso uit, want tijdens het onderzoek moet uw bovenlichaam ontbloot zijn. Ook kunt u een legging of joggingbroek aanhouden, zolang er geen metaal aanhangt.

HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?

Meestal bent u alleen in de MRI-ruimte. De laborant neemt de beelden in de kamer ernaast. Zij ziet u door een raam en houdt u steeds in de gaten. In de tunnel is er een luidspreker waar de laborant tegen u kunt praten. In het midden van het onderzoek zal er via een pomp automatisch contrast ingespoten worden.





MENSTRUELE CYCLUS

Als u nog een menstruatiecyclus heeft, kan het onderzoek alleen plaatsvinden tussen de 7e en de 14e dag van de menstruatiecyclus, omdat hormonen van invloed zijn op het klierweefsel van de borsten. Uw menstruatiecyclus begint steeds op de eerste dag van uw menstruatie.

De cyclus is niet van belang bij controle van de borstprothese(s).

Omdat bij het MRI-onderzoek gebruik wordt gemaakt van een heel sterk magneetveld is het volgende belangrijk:

DUUR VAN HET ONDERZOEK

Het volledig onderzoek duurt ongeveer een uur.

CONTRASTVLOEISTOF

Bij ons MRI-onderzoek van de borsten wordt er in alle gevallen contrastvloeistof toegediend. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende weefsels en klieren en worden eventuele letsels zichtbaar. Vooraleer het onderzoek begint, wordt er een infuus in de arm geprikt. Via dit infuus krijgt u het contrastvloeistof ingespoten tijdens het onderzoek. Het onderzoek hoeft dus niet te worden stopgezet.

